



Eres único, tu medicamento también

AJENJO EXT SECO

Indicaciones terapéuticas

- Inapetencia, dispepsias hipo secretoras, disquinesias hepatobiliares, espasmos gastrointestinales, meteorismo.
- Amenorrea, dismenorrea.
- Oxiuriasis.
- Bronquitis.
- En uso tópico: Dermatomicosis, otitis, heridas, quemaduras y ulceraciones dérmicas.

Interacciones medicamentosas

El ajeno puede inhibir la angiogénesis, que es el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Se recomienda precaución a pacientes que tomen agentes que afectan la angiogénesis. Debido a su contenido de tanino, interacciones son posibles con sales de hierro, zinc o plomo, así como con los alcaloides.

Reacciones secundarias y adversas

Ciertos componentes del ajeno (artemisinina y artesunato) son bien tolerados cuando se ingieren por la boca; no se han reportado efectos adversos.

Dosis y vías de administración

- Extracto seco (5:1): 200 mg, dos a tres veces al día, antes de las comidas.
- 1 g/día, como aperitivo y febrífugo.
- 2-3 g/día, como vermífugo, en tratamientos no superiores a 10 días.

Referencias bibliográficas

Material del fabricante.

Esta información se basa en referencias científicas y fue desarrollada por el Departamento Técnico.
Toda la información contenida en este material ha sido investigada en literatura específica y debe ser revisada por el médico antes de su adopción en la clínica.



medicmag.com.mx



+52 1 442 679 8744



contacto@medicmag.com.mx

Av. 5 de febrero 505 local No.3, la capilla, Santiago de Querétaro, Querétaro C.P. 76170